

## INTRODUÇÃO

Aproximadamente 15% dos pacientes com colite ulcerosa (CU) têm uma agudização severa (ASCU) no curso da doença e cerca de 75% destes doentes respondem aos corticoides endovenosos (CTev).

## MATERIAL/MÉTODOS

### Estudo retrospectivo

**CrITÉRIOS inclusão:** todos pacientes de um centro admitidos entre 2010-2016 com primeiro episódio de ASCU (definida de acordo com os critérios TrueLove e Witts) que responderam aos CTev (definido como  $\leq 3$  dejeções/dia sem sangue 3-7 dias após hidrocortisona 400mg/dia ou metilprednisolona 60mg/dia).

**Objetivo:** Determinar os *outcomes* (recidiva, colectomia e remissão endoscópica) após um episódio de ASCU com resposta aos CTev.

## RESULTADOS

Dados demográficos		N = 43
Idade média +- DP		44 +- 12 anos
Sexo Feminino		22 (51%)
Tabaco		
Não fumadores		38 (88%)
Ex-fumadores		2 (5%)
Fumadores		3 (7%)
Extensão		
Proctite ulcerosa		1 (2%)
CU esquerda		17 (49%)
CU extensa		25 (58%)
Tratamento prévio		
Sem tratamento		26 (61%)
Messalazina		15 (39%)
Imunossupressão		2 (5%)
Escalada para IS		21 (54%)
Média tempo após		27 meses
Escalada para Biológicos		11 (26%)
Média tempo após		54 meses

	%	tempo médio após ASCU
Recidiva ASCU	28%	48 meses
Colectomia	7%	3 meses
Remissão endoscópica (Mayo 0 ou 1)	36%	53 meses

## CONCLUSÕES

- Após um episódio ASCU com resposta aos CTev, 28% tiveram nova ASCU e 7% realizaram colectomia.
- A remissão endoscópica foi alcançada em apenas 36% dos pacientes após um episódio de ASCU.