

Endoscopia Digestiva

EP-110 - AVALIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EFETUADA NA ANEMIA FERROPÉNICA PREVIAMENTE A CÁPSULA ENDOSCÓPICA

Tiago Leal¹; Dalila Costa¹; Sofia Mendes¹; Paula Peixoto¹; Bruno Arroja¹; Raquel Gonçalves¹

1 - Hospital de Braga

Introdução: A cápsula endoscópica (VCE) é um exame bastante útil na anemia ferropénica com exame endoscópico bidirecional negativo. No entanto, para aumentar a rentabilidade, deverá ser efetuado um estudo exaustivo anterior à sua realização. Pretende-se averiguar a extensão dessa investigação prévia, nomeadamente a pesquisa de *H. pylori* (Hp), o rastreio de doença celíaca (DC) e a avaliação da função tiroideia (FT), nos doentes submetidos a VCE por anemia ferropénica.

Materiais e métodos: Incluíram-se os doentes que realizaram VCE por anemia ferropénica de Janeiro de 2013 a Agosto de 2017, num Hospital terciário. Excluíram-se os doentes em que não foi possível obter os dados necessários e aqueles em que a cápsula não passou para o duodeno, bem como os exames com problemas técnicos. Foi avaliada a pesquisa do status Hp (antigénio fecal/histologia), da FT e o rastreio de DC (serologia±histologia)

Resultados: Selecionaram-se 105 doentes, com idade média de $62,1 \pm 17,7$ anos e 68 (64,8%) do sexo feminino. Foram solicitados 64 exames pela Gastreenterologia, 39 pela Medicina Interna e 1 exame pela Oncologia e Imuno-hemoterapia. Verificou-se a pesquisa Hp, rastreio de DC e patologia tiroideia em 49 (46,6%), em 36 (34,3%) e em 57 (54,3%) doentes, respetivamente. Apenas 18,1% (n=19) dos doentes tinha o estudo completo. Nos doentes mais idosos a pesquisa de Hp foi menor ($p < 0,001$), assim como o rastreio de DC ($p < 0,001$). Os doentes ao cargo da Gastreenterologia apresentaram mais frequentemente pesquisa de Hp ($p = 0,047$) e de DC ($p = 0,012$) e menos frequentemente avaliação da FT ($p = 0,009$), comparativamente aos doentes das outras especialidades.

Conclusão: A investigação prévia a VCE foi incompleta na maioria dos casos. A idade avançada parece demover os médicos da pesquisa de Hp e do rastreio da doença celíaca. Os gastreenterologistas estão naturalmente mais sensibilizados para estas patologias, relativamente a outras especialidades.