

Casos Clínicos

EP-180 - INTUSSUSCEPÇÃO ILEO-CÓLICA – MANIFESTAÇÃO DE LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO INTESTINAL

Damião Fs¹; Ismail M²; Ferreira Cn¹; Brito Lx¹; Ribeiro Lc¹; Velosa J¹

1 - CHLN - Hospital de Santa Maria; 2 - Hospital Central de Maputo

Homem de 48 anos referenciado a consulta há 2 anos por diarreia crónica com 5-6 dejetos/dia, fezes pastosas, amarelo-esverdeadas, sem muco ou sangue. Emagrecimento de 7kg (78 para 71kg) no último mês. Antecedentes patológicos irrelevantes para além de esplenectomia pós traumatismo. Exame objectivo e análises sem alterações. Exame bacteriológico e parasitológico das fezes, pesquisa de toxina *Clostridium difficile* e *Yersinia* negativos. Ac. anti-transglutaminase negativo. Endoscopia alta sem alterações. Colonoscopia com mucosa pseudopolipóide do íleon terminal cuja histologia revelou marcada hiperplasia linfóide. TC abdomino-pélvica com nódulo hepático no segmento VIII de 35mm, com aspectos duvidosos de hiperplasia nodular focal/hemangioma, adenopatias no hilo hepático e lomboaórticas. RM abdominal com pólipos milimétricos no íleon terminal, adenopatias no território da artéria ileo-ceco-apendicular e nódulos hepáticos já descritos na TC, com aspectos sugestivos de implantes esplénicos. Entretanto medicado com antidiarreicos, antiespasmódicos e dieta sem lactose e resíduos, com pouca melhoria. Após dois anos é admitido por dor abdominal aguda e hematoquezias. Colonoscopia revelou massa protuberante desde o cego até ao cólon ascendente, de superfície nodular e mucosa hemorrágica. TC abdominal documentou intussuscepção ileocólica que se estendia até ao ângulo esplénico, aumento do número e das dimensões das múltiplas adenopatias e dos implantes esplénicos. Foi realizada ressecção ileocólica. O exame anatomo-patológico pós-operatório documentou linfoma de células do manto. PET-CT mostrou doença infra e supra diafragmática. Atualmente sob quimioterapia.

Linfoma de células do manto é um subtipo relativamente incomum, representado 5-7% de todos os linfomas, com incidência anual de 1-2/100 000. À data do diagnóstico mais de 90% têm doença avançada, com atingimento gastrointestinal em 30-50%, particularmente no íleon terminal e cólon. Intussuscepção por linfoma corresponde <1% de todos os casos no adulto. Apresentamos o caso pela iconografia endoscópica e imagiológica da apresentação incomum duma patologia rara do tubo digestivo.